

1894

Tamaño: Grande.

Forma: Asimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado en toda su longitud siendo más notable en el ápice.

Zona pistilar: En general ligeramente desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice oprimido sobre esbozo de mamelón el cual está situado dentro de una hendidura ancha y profunda.

Sutura: Oprimida, en forma de surco. Hendida en el ápice y en la cavidad peduncular.

Cavidad peduncular: Estrecha y profunda.

Piel: Velloso, de pubescencia muy abundante y lanosa. **Color:** Domina el amarillo anaranjado del fondo. Chapa rojo ciclamen de tono suave y apagado, formada por punteado uniforme que recorre casi toda la superficie dejando entrever ampliamente el fondo y quedando partes considerables libres de chapa. En algunas zonas muy pequeñas el punteado es más compacto, lo cual hace que el color rojo sea más intenso.

Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Muy jugosa, suave, ácida, poco azucarada y poco aromática. **Sabor:** No es agradable.

Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su longitud. Surco dorsal profundo, de anchura media, interrumpido por los surcos laterales y cerrado cerca del ápice. Superficie arenosa, medianamente esculpida con surcos estrechos, profundos y en general cortos, distribuidos por toda la superficie siendo más abundantes en su tercio superior. Punteado muy notable esparcido por toda la superficie. Polo peduncular abierto.

Maduración: Segunda decena de septiembre en Maluenda (Zaragoza).

